

がん種	レジメン名	当院採用薬	用量	用法	投与日	1コース期間
乳がん	AC	ドキシソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注	D 1	21日間
		エトキシサン	600 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	weekly-PTX休薬あり	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	D 1,8,15	28日間
	weekly-PTX休薬なし	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	D 1,8,15,21	28日間
	TC	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	D 1	21日間
		エトキシサン	600 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	VNR	ナバルビン	25 mg/m ²	点滴静注	D 1,8	21日間
	Eriblin	ハラヴェン	1.4 mg/m ²	点滴静注	D 1,8	21日間
	BV+PTX	パクリタキセル	90 mg/m ²	点滴静注	D 1,8,15	28日間
		アバスチン	10 mg/m ²	点滴静注	D 1,15	
	Trastuzumab(A法)	トラスツズマブ	4→2 mg/kg	点滴静注	D 1	7日間
	Trastuzumab(B法)	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間
	Tra-w-PTX	トラスツズマブ	4→2 mg/kg	点滴静注	D 1,8,15,22	28日間
		パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	D 1,8,15	
	Pertuzumab+Tra+DTX	ハーシエタ	840→420 mg/body	点滴静注	D 1	21日間
		トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	D 1	
		ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	Pertuzumab+Tra	ハーシエタ	420 mg/body	点滴静注	D 1	21日間
		トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	D 1	
	T-DM1	カドサイラ	3.6 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間