

がん種	レジメン名	当院採用薬	用量	用法	投与日	1コース期間
大腸がん	mFOLFOX6	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	FOLFIRI	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	SOX	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14	21日間
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	XELOX	ゼローダ	2000 mg/m ²	内服	D 1~14	21日間
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
	IRIS(CPT-11+S-1)	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14	28日間
		イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注	D 1,15	
	BV+mFOLFOX6	アバスタチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	BV+FOLFIRI	アバスタチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	BV+SOX	アバスタチン	7.5 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間
		エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14	
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1	
BV+XELOX	アバスタチン	7.5 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間	
	ゼローダ	2000 mg/m ²	内服	D 1~14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1		
BV+Capecitabine	アバスタチン	7.5 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間	
	ゼローダ	2000 mg/m ²	内服	D 1~14		
BV+IRIS	アバスタチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1,15	28日間	
	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14		
	イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注	D 1,15		
BV+FTD/TPI	アバスタチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1,15	28日間	
	ロンサーフ	70 mg/m ²	内服	D 1~5,8~12		
BV+FOLFOXIRI	アバスタチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間	
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1		

		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
Ramucirumab + FOLFIRI		サイラムザ [®]	8 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
Panitumumab+ mFOLFOX6		ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
Panitumumab+FOLFIRI		ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
Panitumumab		ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
AfliberceptBeta + FOLFIRI		ザルトラップ [®]	4 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
BV+UFT+LV		アバスタチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1,15	28日間
		UFT	300 mg/m ²	内服	D 1~21	
		ホリナート	75 mg/m ²	内服	D 1~21	