

がん種	レジメン名	当院採用薬	用量	用法	投与日	1コース期間
膵がん	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	D 1、8、15	28日間
	GEM+S-1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	内服	D 1、8	21日間
		エスワン	60-100 mg/body	内服	D 1~14	
	GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	D 1、8、15	28日間
		アブラキサン	125 mg/m ²	点滴静注	D 1、8、15	
	FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		イリノテカン	180 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	オニバイド [®] +5FU/I-LV	オニバイド [®]	70 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	