

がん種	レジメン名	当院採用薬	用量	用法	投与日	1コース期間
尿路上皮がん	GEM + CBDCA	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	D 1,8,15	28日間
		カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D 1	
	GC	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	D 1,8,15	28日間
		シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	D 2	
	M-VAC	メソレキセート	30 mg/m ²	点滴静注	D 1,15,22	28日間
		エクザール	3 mg/m ²	点滴静注	D 2,15,22	
		ドキシルビシン	30 mg/m ²	点滴静注	D 2	
		シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	D 2	
Pembrolizumab	キイトルーダ [®]	200 mg/body	点滴静注	D 1	21日間	
Avelumab	ハベンチオ	10 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間	
前立腺がん	DP	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	D 1	21日間
		フレドニン	10 mg/body	内服	D 1~21	
	Cabazitaxel + PSL	カバジタキセル	25 mg/m ²	点滴静注	D 1	21日間
		フレドニン	10 mg/body	内服	D 1~21	
腎細胞がん	Temsirolimus	トーリセル	25 mg/body	点滴静注	D 1	7日間
	Pembrolizumab	キイトルーダ [®]	200 mg/body	点滴静注	D 1	21日間
	Nivolumab	オプジーボ [®]	240 mg/body	点滴静注	D 1	14日間
	Avelumab + Axitinib	ハベンチオ	10 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		インライタ	10 mg/body	内服	D 1~14	
	Pembrolizumab + Lenvatinib	キイトルーダ [®]	200 mg/body	点滴静注	D 1	21日間
レンビマ		20 mg/body	内服	D 1~		