

がん種	レジメン名	当院採用薬	用量	用法	投与日	コース期間
悪性リンパ腫	CHOP	プレドニン	50 mg/m ²	点滴静注	D 1~5	21日間
		ドキシルビシン	50 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		オンコビン	1.4 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	R-CHOP	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	D 1	21日間
		プレドニン	50 mg/m ²	点滴静注	D 1~5	
		ドキシルビシン	50 mg/m ²	点滴静注	D 2	
		オンコビン	1.4 mg/m ²	点滴静注	D 2	
		エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注	D 2	
	RB	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	D 1	28日間
		トレアキシン	90 mg/m ²	点滴静注	D 2,3	
	GB	ガザイハ	1000 mg/body	点滴静注	D 1(,8,15)	28日間
		トレアキシン	90 mg/m ²	点滴静注	D 2,3	
	AVBd	ドキシルビシン	25 mg/m ²	点滴静注	D 1,15	28日間
		エクザール	6 mg/m ²	点滴静注	D 1,15	
		ブレオ	10 mg/m ²	点滴静注	D 1,15	
ダカルバジン		250 mg/m ²	点滴静注	D 1,15		
	Brentuximab Vedotin	アドセトリス	1.8 mg/m ²	点滴静注	D 1	21日間
MDS	Ara-C少量	キロサイト	10 mg/m ²	皮下注×2	D 1~14	
	Azacitidine	ビダーザ	75 mg/m ²	点滴静注	D 1~7	28日間
AML	Azacitidine + Venetoclax	ビダーザ	75 mg/m ²	点滴静注	D 1~7	28日間
		ベネクレクスタ	100→200 →400 mg/body	内服	D 1~28	
多発性骨髄腫	Bortezomib	ホルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	D 1,8,15,22	35日間

